

GEBRAUCHSINFORMATION

HEXORAL[®] - Lösung zum Gurgeln

Arzneiform: Lösung
Z.Nr.: 14.495
Hersteller: Famar Orléans, Frankreich
Pharmazeutischer Unternehmer: Johnson & Johnson GmbH, Wien

Zusammensetzung

100 ml Lösung enthalten: 100,0 mg Hexetidin
22,0 mg Saccharin-Natrium

Eigenschaften und Wirksamkeit

Hexetidin, der Wirkstoff von Hexoral, besitzt ein breites Wirkungsspektrum gegen Erreger von Mund- und Racheninfektionen. Auch Pilzkrankungen im Mund- und Rachenraum, insbesondere Soor, werden durch Hexoral wirksam bekämpft. Ein Nachlassen der Wirkung gegenüber den verschiedenen Erregern ist aufgrund langjähriger Erfahrungen nicht zu erwarten. Hexoral haftet sehr gut an der Schleimhautoberfläche. Daher läßt sich in vielen Fällen auch noch 10 - 12 Stunden nach Anwendung eine antimikrobielle Wirkung nachweisen. Hexoral ist bei vorschriftsmäßiger Anwendung sehr gut verträglich.

Anwendungsgebiete

Hexoral eignet sich zur kurzfristigen Behandlung von

- nicht fieberhaften Entzündungen im Mund- und Rachenraum
- Halsschmerzen bei leichten, nicht fieberhaften Erkältungen
- Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten, Druckstellen bei Zahnprothesenträgern
- Mundfäule sowie kleineren Verletzungen im Mundbereich

Bei folgenden Erkrankungen, bei denen auch Fieber auftreten kann, sollten Sie Hexoral unter ärztlicher Anleitung anwenden:

- fieberhafte grippale Erkrankungen
- Mandelentzündung, Rachenschleimhautentzündung, Angina
- Zahnfleisch- bzw. Mundschleimhautentzündung, Aphthen
- Vorbeugung und Behandlung von Infektionen bei operativen Eingriffen (z.B. Zahnziehen oder Mandeloperationen)
- Behandlung von Pilzkrankungen, vor allem Soor
- Bekämpfung von Mundgeruch bei schweren Erkrankungen im Mund- und Rachenraum (z.B. Tumoren)
- Mundhygiene bei schweren Allgemeinerkrankungen

Art der Anwendung

Zum Spülen oder Gurgeln

Hexoral wird im allgemeinen unverdünnt nach den Mahlzeiten angewendet. Damit es richtig wirken kann, sollten Sie während der nächsten Minuten nichts essen oder trinken.

Dosierung

Falls nicht anders verordnet, Dosierung genau einhalten.

Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren (sofern sie imstande sind, zu gurgeln ohne zu schlucken) wenden Hexoral wie folgt an:

Morgens und abends wird etwa ½ Minute lang mit 1 Eßlöffel **unverdünnter** Hexoral - Lösung die Mundhöhle gespült oder im Rachenraum gegurgelt. Bei einzelnen Entzündungsstellen können Sie die Lösung auch mit Tupfern direkt auftragen. Ein Verschlucken der Lösung ist zu vermeiden.

Kleinere Kinder und Säuglinge dürfen nur auf ärztliche Anordnung mit Hexoral behandelt werden. Betupfen Sie die erkrankten Stellen morgens und abends nach den Mahlzeiten mit einem Hexoral-getränkten Wattestäbchen (nicht wischen oder reiben).

Gegenanzeigen

Bestehen nach derzeitigem Wissensstand nicht

Schwangerschaft und Stillperiode

Hexoral kann in der Schwangerschaft und Stillperiode angewendet werden.

Nebenwirkungen

Bei länger dauernder Anwendung können Veränderungen des Geschmacks hervorgerufen werden. Diese Störung ist jedoch gering und verschwindet wieder vollständig.

Wechselwirkungen

Sind bisher nicht bekannt

Gewöhnungseffekte

Sind bisher nicht beobachtet worden

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

- Bei Fortbestand der Beschwerden, oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist eine ärztliche Beratung erforderlich.
- Wurden versehentlich größere Mengen Hexoral geschluckt, kommt es zu Brechreiz. Eine nennenswerte Aufnahme in den Blutkreislauf ist daher nicht anzunehmen.
- Vor Frost schützen. Bei Nichtbeachtung können kleine punktförmige Ablagerungen an der Flaschenwand auftreten, die jedoch keinen Einfluß auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Hexoral haben.
- Verfalldatum beachten.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Packungsgrößen: 60 und 200 ml Lösung

Lagerungshinweise: Lichtschutz erforderlich

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.