

Tasectan[®] DUO

Anwendungsgebiet

Das Medizinprodukt dient dazu, die physiologischen Funktionen der Darmwand wiederherzustellen sowie Störungen des Gleichgewichts der Bakterienflora des Darmtraktes (Dysbakterie) verschiedener Art und unterschiedlicher Ursache vorzubeugen und zu lindern.

Es ist vorgesehen zur Vorbeugung und Behandlung von Beschwerden im Magen-Darm-Bereich wie Durchfall und anderen damit zusammenhängenden Symptomen wie Blähungen und Bauchschmerzen. Diese können u.a. auch als Folge entzündlicher Darmerkrankungen, der Einnahme von Antibiotika, Chemotherapie u.ä. auftreten. Tasectan Duo[®] wirkt innerhalb von 12 Stunden. Dieses Medizinprodukt trägt dazu bei, die optimale Darmfunktion wiederherzustellen, das Wachstum der endogenen Darmflora anzuregen und somit zu einer Verbesserung der natürlichen Abwehr des Organismus beizutragen.

Anwendungshinweise

Pulver für Kinder: Beutelinhalt der Nahrung zugeben oder in einer kleinen Menge Milch, Fruchtsaft oder Wasser zuführen. Gut mischen und unmittelbar verbrauchen.

Tabletten für Erwachsene: Tabletten zusammen mit Wasser einnehmen.

Inhalt der Packung

Pulver für Kinder: 12 Beutel, die je 250 mg Gelatinetannat und tyndallisierte Milchsäurebakterien enthalten.

Tabletten für Erwachsene: 12 Tabletten, die je 500 mg Gelatinetannat und tyndallisierte Milchsäurebakterien enthalten.

Zusammensetzung

Pulver: Gelatinetannat, tyndallisierte Milchsäurebakterien.

Tabletten: Gelatinetannat, tyndallisierte Milchsäurebakterien, Calciumphosphat, mikrokristallines gefälltes Silicium, Magnesiumstearat, Croscarmellose-Natrium, Polyvinylpyrrolidone, Hydroxypropylmethylcellulose, Titandioxid, mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure, Glycerol, Indigocarmin E 132 und Indigocarmin Aluminiumgel, gereinigtes Wasser (Acqua purificata), pflanzliches Glycerin.

Verwendete Bakterienstämme: *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus*.

Dosierung

Kinder unter 3 Jahren: 1 Beutel alle 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Kinder über 3 Jahren: 1 oder 2 Beutel alle 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Erwachsene: 1 bis 2 Tabletten alle 4 bis 6 Stunden, bis die Symptome abklingen.

Warnhinweise

Beachten Sie bitte folgende Warnhinweise:

- Vor Anwendung des Produktes ist eine Rücksprache mit dem Arzt nicht erforderlich. Sollten schwere oder anhaltende Symptome vorliegen oder die Diagnose unklar sein, ist es ratsam, insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren sowie älteren Patienten, einen Arzt zu konsultieren.
- Bei Durchfallerkrankungen von Kindern unter 3 Jahren empfehlen wir eine Rücksprache mit dem Arzt, insbesondere wenn zusätzliche Symptome vorliegen.
- Es wird empfohlen, reichlich Flüssigkeit zuzuführen und die üblichen diätetischen Maßnahmen, die bei Durchfall angewendet werden, durchzuführen (orale Rehydrierung).
- Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, sollte dieses Medizinprodukt nicht in den ersten Monaten der Schwangerschaft oder während des Stillens angewendet werden. Auf jeden Fall sollten Sie vor der Anwendung stets Ihren Arzt konsultieren.
- Das Medizinprodukt nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
- Das Medizinprodukt nicht einnehmen, wenn die Blisterpackung bzw. der Beutel geöffnet oder beschädigt ist.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern. Nicht einfrieren.
- Das Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen und unerwünschte Wirkungen

Das Medizinprodukt sollte nicht von Patienten eingenommen werden, die eine bekannte Überempfindlichkeit gegen Gelatinetannat oder einen anderen Inhaltsstoff haben.



NOVINTETHICAL PHARMA SA
Via Pian Scaiolo, 11
6915 Lugano - Schweiz



Vertrieb
Pharmazeutische Fabrik
Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstraße 96
6067 Absam (Österreich)

Rev.06: 12.12.2014